

Aspiryl® 75 mg Comprimé

Acide acétylsalicylique

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Aspirin® 75 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aspirin® 75 mg, comprimé ?
3. Comment prendre Aspirin® 75 mg, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Aspirin® 75 mg, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE Aspiryl® 75 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

ANTITHROMBOTIQUES/ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTES À L'EXCLUSION DE L'HÉPARINE - code ATC : B01AC06

Aspiryl® 75 mg est un médicament qui fluidifie le sang afin de réduire le risque de formation de caillots sanguins en évitant la coagulation des plaquettes.

Aspiryl® 75 mg est utilisé par les patients qui présentent un rétrécissement important des vaisseaux sanguins du cœur (angor instable) ou qui ont été victimes d'une crise cardiaque ou d'un infarctus cérébral (AVC). Aspiryl® 75 mg permet de réduire le risque de récurrence et de nouvel infarctus en évitant la formation de caillot dans les vaisseaux sanguins du cœur et du cerveau.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Aspiryl® 75 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais Aspiryl® 75 mg, comprimé :

- Si vous êtes allergique à l'acide acétylsalicylique, à d'autres médicaments visant à inhiber la douleur ou l'inflammation (anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ;
- Si vous présentez des symptômes allergiques (comme des difficultés respiratoires, nez bouché ou qui coule, éruption cutanée) lors de la prise d'acide acétylsalicylique ou de médicaments similaires utilisés pour traiter une inflammation ;
- Si vous souffrez d'ulcères ;
- Si vous souffrez d'hémophilie ;
- Si vous présentez un déficit en plaquettes qui permettent au sang de coaguler ;
- Si vous avez une cirrhose du foie ;
- Si vous avez une maladie grave du cœur.

La dose d'Aspiryl® 75 mg ne doit pas excéder 100 mg par jour au cours des trois premiers mois de grossesse (voir rubrique « Grossesse, allaitement et fertilité »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Aspiryl® 75 mg.

Informez votre médecin avant de débuter le traitement par Aspiryl® 75 mg :

- Si vous êtes traité(e) avec un médicament visant à éviter la formation de caillots sanguins ou un diurétique ;
- Si vous avez une maladie gastro-intestinale ;
- Si vous avez une insuffisance cardiaque ;
- Si vous avez une maladie des reins ou du foie.

Les personnes souffrant d'asthme bronchique, d'une maladie pulmonaire chronique, de rhume des foies ou de polypes nasaux présentent un risque élevé de réactions d'hypersensibilité.

Autres médicaments et Aspiryl® 75 mg, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'efficacité du traitement peut être affectée en cas de prise simultanée d'Aspiryl® 75 mg et d'autres médicaments pour :

- Les caillots sanguins (la warfarine par exemple) ;
- Le rejet d'organes après une transplantation (ciclosporine, tacrolimus) ;
- Une tension artérielle élevée (les diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine [ECA] par exemple) ;
- La douleur et l'inflammation (les corticostéroïdes et les AINS par exemple) ;
- La goutte (probénécide) ;
- Le cancer et la polyarthrite rhumatoïde (méthotrexate) ;
- Les troubles du rythme cardiaque (digoxine) ;
- Le trouble maniaco-dépressif (lithium) ;
- L'épilepsie (phénytoïne et acide valproïque) ;
- Le diabète de type II (sulfonylurés) ;
- Un cholestérol élevé (acide nicotinique).

Aspiryl® 75 mg, comprimé avec de l'alcool

L'association d'Aspiryl® 75 mg et d'alcool peut augmenter le risque de saignement digestif.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Les femmes enceintes ne doivent pas prendre d'acide acétylsalicylique pendant la grossesse, sauf s'il leur prescrit par leur médecin. La dose ne doit pas excéder 100 mg par jour au cours des trois premiers mois de grossesse (voir rubrique « Ne prenez jamais Aspiryl® 75 mg »). La prise de doses régulières ou élevées de ce médicament en fin de grossesse peut entraîner de graves complications à la fois pour la mère et l'enfant.

L'acide acétylsalicylique passe dans le lait maternel mais n'affecte probablement pas l'enfant allaité. Toutefois, il convient de consulter un médecin si la prise régulière d'Aspiryl® 75 mg est nécessaire pendant l'allaitement.

Comme de nombreux autres anti-inflammatoires (appelés AINS), Aspiryl® 75 mg peut retarder l'apparition d'une grossesse et il est donc déconseillé chez les femmes qui essayent de tomber enceinte.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aspiryl® 75 mg n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Vous êtes responsable de déterminer si vous êtes en état de conduire ou de réaliser des travaux nécessitant une concentration accrue. L'un des facteurs pouvant affecter cette aptitude est la prise des médicaments en raison de leurs effets et/ou leurs effets secondaires. Ces effets et effets secondaires sont décrits dans une autre rubrique. Par conséquent, Veuillez lire l'intégralité » de cette notice pour disposer de toutes les informations nécessaires. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

3. COMMENT PRENDRE Aspiryl® 75 mg, comprimé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose doit être fixée par le médecin, qui l'adaptera en fonction de votre cas individuel. La dose habituelle est de un comprimé par jour.

Si vous avez pris plus de Aspiryl® 75 mg, comprimé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement trop de comprimés, contactez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence le plus proche. Montrez les comprimés restants ou la boîte vide au médecin.

Si vous oubliez de prendre Aspiryl® 75 mg, comprimé

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fréquent (survenant chez plus d'un patient sur 100) : Problèmes d'estomac, risque de saignement augmenté.

Peu fréquent (survenant chez plus d'un patient sur 1 000) : Réactions d'hypersensibilité, telles que rhume des foies, allergie, rhumes de cerveau et asthme.

Rare (survenant chez plus d'un patient sur 10 000) : Hémorragie digestive, hémorragie cérébrale, effets sur les reins, réactions cutanées sévères.

Les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme présentent un risque majoré de réactions d'hypersensibilité. Des écoulements mineurs de sang peuvent parfois entraîner une anémie.

La présence de vertiges et d'acouphènes peut évoquer un surdosage.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le Centre National de Pharmacovigilance (CNPV).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER Aspiryl® 75 mg, comprimé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette, l'emballage ou le pilulier après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Les piluliers contiennent également des agents dessiccateurs qui doivent rester dans l'emballage. Piluliers en plastique : Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Aspiryl® 75 mg, comprimé

La substance active est :

Acide acétylsalicylique..... 75 mg

pour un comprimé.

Les autres composants sont :

Amidon de maïs, Povidone.

Qu'est-ce que Aspiryl® 75 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé.

Pilulier en plastique contenant 100 comprimés.

AMM n° : Aspiryl® 75 mg - Etui de 100 comprimés

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qui l'a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد ولا ترد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الادواء في متناول ايدي الاطفال

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Advans Pharma

2, Rue de l'énergie, ZI Charguia 1

2035 Tunis –Carthage. Tunisie

