

ROSUVANS® 5 mg, Comprimé pelliculé ROSUVANS® 10 mg, Comprimé pelliculé ROSUVANS® 20 mg, Comprimé pelliculé

Rosuvastatine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ROSUVANS®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ROSUVANS®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre ROSUVANS®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver ROSUVANS®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ROSUVANS®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - code ATC : C10A A07.

ROSUVANS® appartient au groupe des médicaments appelés statines.

ROSUVANS® vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, ROSUVANS® est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé,
 - Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypocholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de ROSUVANS®.
- Qu :
- Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

Pourquoi il est important de continuer de prendre ROSUVANS® :

- ROSUVANS® est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.
- Il y a différentes types de cholestérol trouvé dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).
- ROSUVANS® peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol » ;
- Il agit en aidant à bloquer la production du « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts gras peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre. Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre ROSUVANS®, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ROSUVANS®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ROSUVANS®, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la **rosuvastatine** ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,
 - Si vous êtes **enceinte**, si vous allaitez, **arrêtez immédiatement** le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par ROSUVANS®
 - Si vous avez **actuellement** des problèmes hépatiques.
 - Si vous avez **des problèmes rénaux graves** (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
 - Si vous avez **des troubles musculaires appelés myopathie** (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
 - Si vous **prenez de la ciclosporine** (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).
 - Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.
- De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de rosuvastatine (dosage le plus élevé) si :**
- vous avez une **insuffisance rénale modérée** (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
 - vous avez **des troubles de la thyroïde** ;
 - vous avez **des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées**, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
 - vous consommez **régulièrement des quantités importantes d'alcool** ;
 - vous êtes **d'origine asiatique** (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
 - vous êtes déjà traité(e) par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé **fibrate**.
- Si vous êtes concerné(e) par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), **parlez-en à votre médecin.**

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ROSUVANS® :

- Si vous avez **des problèmes hépatiques**.
- Si vous avez **des problèmes rénaux**.
- Si vous avez **des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées**, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez **déjà présenté** des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ; contacter immédiatement votre médecin si vous avez des douleurs musculaires inexpliquées particulièrement si vous ne sentez pas bien ou si vous avez de la fièvre ; informer également votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une faiblesse musculaire qui est constante.
- Si vous consommez **régulièrement des quantités importantes d'alcool**.
- Si vous avez **des troubles de la thyroïde**.
- Si vous êtes **déjà traité par un autre médicament abaissant le taux de cholestérol appelé fibrate** ; veuillez consulter les informations contenues dans la notice ; et ce, même si vous avez déjà pris dans le passé un médicament qui abaisse le taux de cholestérol
- Si vous **prenez un médicament pour traiter l'infection au VIH**, par exemple du ritonavir avec lopinavir et/ou atazanavir, reportez-vous à la rubrique « Autres médicaments et ROSUVANS® ».
- Si vous **prenez ou avez pris durant les 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique** (un médicament contre les infections bactériennes), par voie orale ou par injection. L'association d'acide fusidique et de ROSUVANS® peut causer de graves problèmes musculaires (rhabdomyolyse). Répérez-vous à la rubrique « Autres médicaments et ROSUVANS® ».
- Si vous avez **plus de 70 ans** (votre médecin a besoin de choisir la dose initiale de ROSUVANS® adaptée pour vous).
- Si vous avez une **insuffisance respiratoire grave**.
- Si vous êtes **d'origine asiatique** (japonaise, chinoise, philippine, vietnamienne, coréenne et indienne) (votre médecin a besoin de choisir la dose initiale de ROSUVANS® adaptée pour vous).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute) :

Vous ne devez pas prendre 40 mg de ROSUVANS® (le dosage le plus élevé) ; vous devez vérifier avec votre médecin ou pharmacien la dose de ROSUVANS® avant de débuter le traitement.

chez un petit nombre de sujets, les statines peuvent avoir un effet sur le foie, ceci est identifié par un simple test de recherche d'augmentation des enzymes du foie dans le sang. Pour cette raison, votre médecin pratiquera habituellement un test sanguin (bilan hépatique) avant traitement et au cours du traitement.

Au cours de votre traitement avec ce médicament, si vous êtes diabotique ou si vous présentez un risque de survenue d'un diabète, vous serez suivi attentivement par votre médecin. Vous pouvez développer un diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) et de graisses élevés dans le sang, si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression artérielle (tension) élevée.

Enfants et adolescents

- Si le patient est un enfant âgé de moins de 6 ans : ROSUVANS® ne doit pas être donné aux enfants de moins de 6 ans ;
 - Si le patient est âgé de moins de 18 ans : la dose de 40 mg ne doit pas être utilisée chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
- Autres médicaments et ROSUVANS®, comprimé pelliculé :
- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
- Dites à votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :
- Ciclosporine (utilisée par exemple après une greffe d'organe).
 - Warfarine (ou clopidogrel) (ou tout autre médicament pour fluidifier le sang).
 - Fibrates (comme le fenofibrate, le fenofibrate), ou tout autre médicament qui abaisse le cholestérol sanguin (comme l'ézémibe).
 - Un antiacide (utilisé pour neutraliser l'acidité de votre estomac).
 - Erythromycine (antibiotique), acide fusidique (un antibiotique – voir ci-dessous et rubrique « Avertissements et précautions »).
 - Un contraceptif oral (pilule).
 - Régoprafénil (utilisé pour traiter le cancer).
 - Un traitement hormonal substitutif (THS) de la ménopause.
 - N'importe lequel des médicaments suivants utilisés pour traiter des infections virales, including Infection par le VIH et Hépatite C, seul ou en association (voir Avertissements et précautions d'emploi) : ritonavir, lopinavir, atazanavir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, elbasvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, gécaprevir, pibrentasvir.

Les effets de ces médicaments pourraient être modifiés par ROSUVANS® ou pourraient modifier l'effet de ROSUVANS®.

Si vous avez besoin d'acide fusidique par voie orale pour traiter une infection bactérienne, vous aurez besoin d'arrêter temporairement ce médicament. Votre docteur vous indiquera le moment le plus sûr pour reprendre ROSUVANS®. Prendre ROSUVANS® en association avec de l'acide fusidique peut, dans de rares cas, mener à de faiblesse musculaires, une sensibilité ou des douleurs musculaires (rhabdomyolyse). Plus d'informations sur la rhabdomyolyse sont disponibles à la rubrique 4.

ROSUVANS®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons :

Vous pouvez prendre ROSUVANS® avec ou sans aliments

Grossesse et allaitement :

Vous ne devez pas prendre ce médicament si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, arrêtez le traitement immédiatement et consultez votre médecin. Les femmes doivent éviter une grossesse pendant un traitement par ROSUVANS® en utilisant un contraceptif adapté.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

La plupart des personnes peuvent conduire une voiture ou utiliser une machine lorsqu'elles prennent ce médicament, leur aptitude n'est pas affectée. Cependant, quelques personnes ont des vertiges lors du traitement par ROSUVANS®, Si vous éprouvez des vertiges, consultez votre médecin avant de conduire ou d'utiliser une machine.

ROSUVANS®, comprimé pelliculé contient du lactose

Ce médicament contient du lactose.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Voir la rubrique « Contenu de l'emballage et autres informations » si vous souhaitez la liste complète des composants

3. COMMENT PRENDRE ROSUVANS®, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Doses usuelles chez les adultes :

Si vous prenez ROSUVANS® pour un taux de cholestérol élevé :

Dose initiale

Votre traitement avec ROSUVANS® doit débuter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous prenez une dose plus élevée d'une autre statine avant.

- Le choix de la dose initiale dépendra de :
 - Votre taux de cholestérol.
 - Vos risques d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral
 - Facteurs pouvant vous rendre plus sensible à certains effets indésirables.
- Veillez vérifier auprès de votre médecin ou pharmacien la dose initiale qui vous est le mieux adaptée

Une dose initiale de 5 mg par jour est recommandée chez les patients :

- **D'origine asiatique** (japonaise, chinoise, philippine, vietnamienne, coréenne et indienne),
- **Âgés de plus de 70 ans**,
- Présentant une insuffisance rénale modérée,
- Présentant des facteurs prédisposant à une myopathie (atteinte musculaire),

Augmentation de la dose et dose maximale quotidienne

Votre médecin peut décider d'augmenter les doses jusqu'à ce que la posologie soit appropriée pour vous. Si vous débutez à 5 mg, votre médecin peut décider de doubler la dose jusqu'à 10 mg puis 20 mg puis 40 mg si nécessaire. Si vous commencez avec 10 mg, votre médecin peut décider de doubler la dose jusqu'à 20 mg puis 40 mg si nécessaire. Une période de 4 semaines est nécessaire entre chaque adaptation de dose.

La dose maximale quotidienne est de 40 mg. Cette dose concerne les patients ayant un taux de cholestérol élevé et un risque élevé d'avoir une attaque cardiaque ou un accident cérébral vasculaire pour lesquels le taux de cholestérol n'a pas été suffisamment baissé avec 20 mg.

Si vous prenez ce médicament pour réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Cependant votre médecin pourra décider d'utiliser une dose plus faible si vous avez l'un des facteurs mentionnés ci-dessus.

Utilisation chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans :

La dose moyenne chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans est de 5 à 20 mg une fois par jour. La dose initiale usuelle est de 5 mg par jour et votre docteur pourra augmenter progressivement votre dose afin de trouver la dose adaptée de ROSUVANS®. La dose journalière maximale de ce médicament est 10 ou 20 mg pour les enfants âgés de 6 à 17 ans en fonction de votre pathologie sous-jacente traitée. Prenez cette dose une fois par jour. La dose de 40 mg ne doit pas être utilisée chez les enfants.

Prise de vos comprimés

Avalez chaque comprimé en entier avec de l'eau. ROSUVANS® doit être pris une fois par jour. Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la journée avec ou sans nourriture. Il est recommandé de prendre votre comprimé chaque jour à la même heure, ceci vous évitera d'oublier de le prendre.

Contrôle régulier de votre cholestérol

Il est important que vous retourniez voir votre médecin pour des contrôles réguliers de votre cholestérol afin d'être sûr que ce dernier est bien contrôlé. Votre médecin peut décider d'augmenter la dose de ROSUVANS® jusqu'à ce qu'elle soit appropriée pour vous.

Si vous avez pris plus de ROSUVANS®, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou l'hôpital la plus proche pour avis. Si vous allez à l'hôpital ou recevez un traitement pour une autre cause, prévenez l'équipe médicale que vous prenez ROSUVANS®.

Si vous oubliez de prendre ROSUVANS®, comprimé pelliculé :

Ne prenez pas de comprimé supplémentaire pour rattrapper le comprimé que vous avez oublié de prendre. Ne prenez pas de double dose pour compenser celle que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre ROSUVANS®, comprimé pelliculé :

Informez votre médecin si vous souhaitez arrêter ROSUVANS® car votre taux de cholestérol devrait encore augmenter. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Il est important que vous soyez informés des effets indésirables possibles. Ils sont habituellement légers et de courte durée.

Arrêtez de prendre ROSUVANS® et consultez immédiatement un médecin si vous avez les réactions allergiques suivantes :

- Difficulté à respirer avec ou sans gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge
- Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge qui peut causer des difficultés pour avaler
- Démangeaison sévère de la peau (avec des cloques),

Consultez votre médecin immédiatement :

- Si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps. Les symptômes musculaires sont plus fréquents chez les enfants et adolescents que chez les adultes. Comme avec les autres statines, un très petit nombre de personnes ont eu des problèmes musculaires qui ont rarement entraîné un danger pour la vie de ces personnes (rhabdomyolyses).
- Si vous présentez une déchirure musculaire.
- Si vous souffrez d'un syndrome lupique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des effets sur les cellules sanguines).

Effets indésirables fréquents (entre 1 cas sur 10 et 1 cas sur 100 patients) :

- Maux de tête, douleurs d'estomac, constipation, sensation de malaise, douleurs musculaires, sentiment général de faiblesse, sensations vertigineuses.
- Augmentation des protéines dans les urines à la dose de 40 mg – ceci revient généralement à la normale sans avoir à arrêter le traitement.
- Diabète : vous pouvez débiter un diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) et de graisses élevées dans le sang, si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression artérielle (tension) élevée. Vous serez suivi attentivement par votre médecin au cours de votre traitement avec ce médicament.

Effets indésirables peu fréquents (entre 1 cas sur 100 et 1 cas sur 1000 patients) :

- Eruptions cutanées, démangeaisons, autres réactions cutanées.
- Augmentation des protéines dans les urines – ceci revient généralement à la normale sans avoir à arrêter le traitement de ROSUVANS®.
- Effets indésirables rares (entre 1 cas sur 1000 et 1 cas sur 10 000 patients) :
- Réactions allergiques graves : elles peuvent se manifester par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une démangeaison sévère de la peau (avec des cloques), si vous ressentez ces signes, vous devez arrêter de prendre ROSUVANS® et consulter immédiatement un médecin.
- Atteintes des muscles chez l'adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de prendre ROSUVANS® et consultez votre médecin immédiatement.
- Douleur sévère au niveau de l'estomac (inflammation du pancréas).
- Augmentation des enzymes du foie dans le sang.
- Saignement ou apparition d'hématomes plus facilement qu'habituellement dus au faible taux de plaquettes.
- Syndrome lupique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des effets sur les cellules sanguines).

Effets indésirables très rares (moins de 1 cas sur 10 000 patients) :

- Jaunisse (jaunissement de la peau et des yeux), hépatites (inflammation du foie), traces de sang dans les urines, atteinte des nerfs de vos bras et de vos jambes (tels que des engourdissements), douleur au niveau des articulations, perte de mémoire et augmentation de la taille de la poitrine chez l'homme et la femme (gynécomastie).

Effets indésirables de fréquence inconnue :

- Diarrhée, syndrome de Stevens-Johnson (réaction bulleuse grave au niveau de la peau, de la bouche, des yeux, des dents et des parties génitales), toux, essouffement, oedème (gonflement), troubles du sommeil, y compris insomnie et cauchemars, difficultés sexuelles, dépression, problèmes respiratoires, y compris toux persistante et/ou essoufflement ou fièvre, atteinte des tendons et faiblesse musculaire qui est permanente.

Déclaration des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le Centre National de Pharmacovigilance (CNPV). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ROSUVANS®, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver dans l'emballage d'origine à une température ne dépassant pas 30°C.

Tenir à l'abri de l'humidité

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient ROSUVANS®, comprimé pelliculé

ROSUVANS® 5 mg, comprimé pelliculé :

- La substance active est :

Rosuvastatine.....5,00 mg

Sous forme de rosuvastatine calcique

ROSUVANS® 10 mg, comprimé pelliculé :

- La substance active est :

Rosuvastatine.....10,00 mg

Sous forme de rosuvastatine calcique

ROSUVANS® 20 mg, comprimé pelliculé :

- La substance active est :

Rosuvastatine.....20,00 mg

Sous forme de rosuvastatine calcique

- Les autres composants sont :

Naouy du comprimé : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, phosphate tricalcique, croscopolone, stéarate de magnésium.

Pelliculage ROSUVANS® 5 mg : hypromellose, cellulose microcristalline, acide stéarique, PEG 3350, dioxyde de titane (E171), talc, Oxyde de fer jaune (E 172).

Pelliculage ROSUVANS® 10 mg : hypromellose, cellulose microcristalline, acide stéarique, PEG 3350, dioxyde de titane (E171), talc, Oxyde de fer rouge (E 172).

Pelliculage ROSUVANS® 20 mg : hypromellose, cellulose microcristalline, acide stéarique, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que ROSUVANS® et contenu de l'emballage extérieur ?

ROSUVANS® 5mg :

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé jaune pelliculé.

Chaque boîte contient 30 comprimés pelliculés

ROSUVANS® 10mg :

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé rose pelliculé.

Chaque boîte contient 30 comprimés pelliculés

ROSUVANS® 20mg :

Ce médicament se présente sous la forme de comprimé blanc pelliculé.

Chaque boîte contient 30 comprimés pelliculés

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

AMM n° : 9413121 ROSUVANS® 5 mg- Etui de 30 comprimés

AMM n° : 9413122 ROSUVANS® 10 mg- Etui de 30 comprimés

AMM n° : 9413123 ROSUVANS® 20 mg- Etui de 30 comprimés

Mode de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.

- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

إن هذا دواء

- الدواء منمضطر ولكن ليس كغيره من المنمضترات.

- الدواء منمضطر يؤثر على صحتك وامتهلكه خلافا للتعليمات يعرف ضحك الخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيراء بالدواء وينبغي وضرره.

- لا تلتقط مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تاعد ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

- لا تترك الادوية في متناول ايدي الاطفال

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Laboratoire Advans Pharma,

2, rue de l'énergie ZI Charguia 1 -2035-Tunis-Carthage

